

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP - 1 - 4 - 71 167694

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION CHAMPAGNE

(ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE)

Villa Blanche - 62, Rte Nationale - La Neuville, 51-REIMS - Tél. 47.22.87 47.13.82

ABONNEMENT ANNUEL : 25 F
C.C.P. CHALONS-sur-MARNE 2.800.67 W

Régisseur de Recettes de la Direction
Départementale de l'Agriculture
à Châlons-sur-Marne

SUPPLEMENT N° 3 au BULLETIN n° 126 de MARS 1971

30 mars 1971 / n° 5

ARBRES FRUITIERS

Désherbage des fruits à pépins

Additif au supplément n° 2 n° 126 de mars 1971

Il y a lieu d'ajouter parmi les herbicides cités : La Benzuride ou Benzodiuron commercialisé seulement en association à l'aminotriazole + dalapon. Outre son emploi en désherbage d'arbres fruitiers à pépins, cette association de produits est autorisée sur prunier, cerisier, pêcher...

Tavelure du poirier :

Toutes les variétés qui vont atteindre le stade C3 (pointes des feuilles visibles) devront recevoir une protection anti-tavelure, avant les prochaines pluies, contre des contaminations possibles provenant des spores produites à partir des chancres installés sur les rameaux. Il est recommandé d'exécuter ce traitement à l'aide d'un produit cuprique actif également contre la maladie bactérienne due au *Pseudomonas syringae* (Temps froid et humide favorable aux infections).

Anthronome du pommier :

Ce parasite est à l'heure actuelle surtout dommageable sur les arbres de plein vent; toute intervention est inutile dans les vergers isolés de type industriel où cet insecte est rarement présent.

Dans les plantations mitoyennes d'arbres de plein vent la protection contre l'anthronome doit se faire entre le stade B et C, à l'aide de lindane 12 g. de M.A./Hl ou de Metoxychlore 100 g. de M.A./Hl.

GRANDE CULTURE

Gros charançon de la tige du colza d'hiver :

Par suite de conditions climatiques défavorables les sorties et l'activité du gros charançon de la tige sont jusqu'à présent très réduites.

Même dans les secteurs les plus hâtifs et très envahis au cours des dernières campagnes, les piqûres sont encore rares sur les colzas qui eux-mêmes n'évoluent que très lentement.

Il apparaît donc prématuré de traiter.

L'intervention est à envisager dès qu'il y aura un sensible relèvement des températures :

- dans les secteurs où des pullulations ont été observées ces dernières années.
- dans toutes les régions où la culture du colza d'hiver est en régression importante par rapport à la précédente campagne.

Les Contrôleurs chargés des

Avertissements Agricoles
Imprimerie de la Station de CHAMPAGNE - Directeur-Gérant L. BOUYX
H. de MEIRLEIRE - A. GODIN

l'Inspecteur de la Circonscription
Phytopathitaire "CHAMPAGNE"
J. DELATTRE

7345